



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Suivis de l'avifaune landicole sur le site N2000 des Landes de Touvérac - Saint Vallier

Commune de Touvérac (16)

Rapport de synthèse – Session 2024

Octobre 2024



47 av. des Ribas, 13 770 Venelles, France, +33 (0)4 42 20 12 57
172 av du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles, France

www.mtda.fr
mtda@mtda.fr



SOMMAIRE

1 Préambule	4
2 Méthodologie du suivi avifaune 2024	4
3 Données existantes	5
4 Résultats du suivi avifaune 2024.....	6
4.1 Calendrier des inventaires	6
4.2 Résultats des inventaires	6
5 Discussion des résultats.....	11
6 ANNEXES	12
Données d'inventaire	12

<i>Carte 1 : Localisation des points d'inventaire avifaune</i>	<i>4</i>
<i>Carte 2 : Localisation des données existantes sur les espèces d'oiseaux landicoles</i>	<i>5</i>
<i>Carte 3 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 1</i>	<i>8</i>
<i>Carte 4 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 2</i>	<i>8</i>
<i>Carte 5 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 3</i>	<i>9</i>
<i>Carte 6 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 4</i>	<i>9</i>
<i>Carte 7 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 5 et 6</i>	<i>10</i>
<i>Carte 8 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 7</i>	<i>10</i>
<i>Tableau 1 : Calendrier des inventaires avifaune landicole</i>	<i>6</i>
<i>Tableau 2 : Liste des espèces d'oiseaux à enjeu sur le site N2000</i>	<i>7</i>

L'AUTEUR DU SUIVI

 AGENCE MTDA CONSEIL EN ENVIRONNEMENT	Céline LEMAIRE, chargé d'étude écologue, naturaliste faune
--	---

Source des illustrations : sauf indication contraire, l'auteur des documents graphiques, tableaux, schémas, cartes et photographies est l'Agence MTDA.

1 Préambule

Dans le cadre de l'animation du site Natura, et avec pour objectif le bon déroulement de la mise en œuvre des actions du DOCOB, l'agence MTDA, structure animatrice, a réalisé au printemps et été 2024 un suivi avifaune par points d'écoute sur les Landes de Touvérac.

2 Méthodologie du suivi avifaune 2024

Les prospections diurnes et nocturnes de l'avifaune ont été mises en place à l'aide de points fixes d'observation de 20min.


Les points fixes offrent l'avantage en conditions de détection optimale lors de pics d'activité (aube, crépuscule) de l'avifaune, de dresser très rapidement une première liste qualitative des espèces et d'appréhender leur comportement dans les différentes aires d'études. Les espèces y sont principalement notées à l'ouïe en milieu arboré mais également à vue.

À chaque passage, tous les contacts visuels et sonores des espèces manifestant un comportement territorial de reproduction sont notés.

Chaque espèce a été localisée sur une cartographie lors de la réalisation de ces points.

Localisation des points d'inventaires - Avifaune landicole

Touvérac (16)




Carte 1: Localisation des points d'inventaire avifaune

3 Données existantes

Les espèces d'oiseaux inféodés aux milieux landicoles pour leur nidification ou leur alimentation ont été recherchées dans les données existantes pour orienter nos prospections. 6 espèces d'intérêt patrimonial ont été retenues : le Busard cendré (*Circus pygargus*), le busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), le Circaète-Jean-Le-Blanc (*Circaetus gallicus*), l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), la Fauvette Pitchou (*Curruca undata*) et la Pie-Grièche écorcheur (*Lanius collurio*).

Localisation des données d'espèces d'oiseaux landicoles existantes

Touvérac (16)



Carte 2 : Localisation des données existantes sur les espèces d'oiseaux landicoles

4 Résultats du suivi avifaune 2024

4.1 Calendrier des inventaires

Les dates de passages pour la réalisation des points d'écoute avifaune sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Calendrier des inventaires avifaune landicole

Date	Type	Intervenant	Conditions météorologiques
20/05/24	Diurne	Romain MAILLET	-
21/05/24	Diurne	Romain MAILLET	-
22/05/24	Diurne	Romain MAILLET	-
26/06/24	Nocturne	Céline LEMAIRE	Beau, pas de vent, 25°
27/06/24	Diurne	Céline LEMAIRE	Variable, pas de vent, 20°-23°

4.2 Résultats des inventaires

Lors du suivi avifaune landicole effectué en mai et juin 2024, nous avons pu mettre en évidence la présence de 41 espèces d'oiseaux au sein du site N2000 des Landes de Touvérac-Saint Vallier.

La liste de l'ensemble des espèces est consultable en annexes.

Parmi ces espèces, 9 ont un intérêt patrimonial notable (*à minima modéré*) : 3 à enjeu fort et 6 à enjeu modéré. Elles appartiennent à 3 cortèges :

Les milieux ouverts à semi-ouverts :

- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*),
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*),
- Serin cini (*Serinus serinus*)

Les milieux forestiers :

- Mésange nonnette (*Poecile palustris*)
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
- Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*)
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

Milieux landicoles à forestiers :

- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

Le tableau ci-dessous référencient ces espèces.


Tableau 2 : Liste des espèces d'oiseaux à enjeu sur le site N2000

Nom valide (TAXREF V.16)	Statuts						Nombre de contact	Intérêt patrimonial	Statut biologique sur le site	Enjeu local de conservation
	Protection	Menace				Déterminante ZNIEFF Poitou-Charente 16				
		Liste rouge - France - Nichéurs	Liste rouge France - Hivernants	Liste rouge France - Passage	Liste rouge Poitou-Charente					
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i> Linnaeus, 1758	PN3 DO1	LC	-	LC	VU	D	1	FORT	Survол, Chasse probable	FORT
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	PN3 DO1	LC	-	NAc	LC	D	8	FORT	Reproduction, Alimentation	FORT
Mésange nonnette <i>Poecile palustris</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	-	VU	D	2	FORT	Reproduction, Alimentation	FORT
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i> Linnaeus, 1758	PN3	VU	NAd	NAd	NT	-	2	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i> Rafinesque, 1810	PN3	VU	-	-	NT	-	5	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE
Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	-	VU	-	3	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i> Linnaeus, 1758	PN3	NT	NAd	NAd	VU	-	3	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE
Serin cini <i>Serinus serinus</i> Linnaeus, 1766	PN3	VU	-	NAd	NT	-	5	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus, 1758	DO2	VU	-	NAc	VU	-	20	MODERE	Reproduction, Alimentation	MODERE

Les points de contacts avec les différentes espèces bénéficiant de statuts de protection ou de conservation notables sont cartographiés ci-après. Pour plus de lisibilité, une carte a été réalisée par secteur du site N2000 ; ils ont été nommés ZSC 1 à 7.

Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC1


Touvérac (16)



Carte 3 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 1


Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 2

Touvérac (16)




Carte 4 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 2

Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 3
Touvérac (16)




Carte 5 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 3

Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 4
Touvérac (16)




Carte 6 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 4

Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC5 et 6
Touvérac (16)



Carte 7 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 5 et 6

Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 7
Touvérac (16)



Carte 8 : Localisation des points de contacts avec l'avifaune à enjeu - Site ZSC 7

5 Discussion des résultats

Les résultats du suivi avifaune landicole de l'année 2024 présentent une majorité d'oiseaux forestiers et prairiaux. Seul l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), espèce inféodée aux landes à végétation assez haute composée de Callune et d'Ajoncs pour sa reproduction est présent ; il se reproduit à même le sol sans faire de nid. La Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), espèce nichant dans les forêts matures, utilisent potentiellement les milieux landicoles du site N2000 comme zone de chasse aux insectes.

Aucune autre espèce telles que le Tarier pâtre (*Saxicola rubicola*), la Fauvette pitchou (*Curruca undata*), le Pipit rousseline (*Anthus campestris*) ou la Pie-Grièche écorcheur (*Lanius collurio*) n'ont été contactées.

Cela peut s'expliquer par le fait que les points d'écoute ont été placés suivant des données d'espèces anciennes et des cartes aériennes en constante évolution. Par conséquent, certains points d'écoute ont été faits dans des habitats non landicoles (lisières en bordure de culture, jeune milieu forestier etc). Pour que le suivi puisse être plus rigoureux, il serait bien d'avoir une carte d'habitats naturels récente du site N2000 qui permettrait de localiser précisément les zones landicoles.

Il serait donc souhaitable de compléter ce suivi en 2026 en repensant le nombre et la position des points d'écoute à partir d'une carte d'habitats naturels récente.

6 ANNEXES

Données d'inventaire

Nom valide (TAXREF V.16)	Statuts						Nombre de contact	Intérêt patrimonial	Statut biologique sur le site	Enjeu local de conservation
	Protection	Menace				Déterminante ZNIEFF Poitou-Charente				
		Liste rouge France - Nicheurs	Liste rouge France - Hivernants	Liste rouge France - Passage	Liste rouge Poitou-Charente					
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i> Linnaeus, 1758	PN3 DO1	LC	-	LC	VU	D	1	FORT	Survol, Chasse probable	FORT
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	PN3 DO1	LC	-	NAc	LC	D	8	FORT	Reproduction , Alimentation	FORT
Mésange nonnette <i>Poecile palustris</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	-	VU	D	2	FORT	Reproduction , Alimentation	FORT
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i> Linnaeus, 1758	PN3	VU	NAd	NAd	NT	-	2	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i> Rafinesque, 1810	PN3	VU	-	-	NT	-	5	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	-	VU	-	3	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i> Linnaeus, 1758	PN3	NT	NAd	NAd	VU	-	3	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Serin cini <i>Serinus serinus</i> Linnaeus, 1766	PN3	VU	-	NAd	NT	-	5	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus, 1758	DO2	VU	-	NAc	VU	-	20	MODERE	Reproduction , Alimentation	MODERE
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	PN3	LC	NAd	-	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE

Suivis de l'avifaune landicole – Session 2024

Landes de Touvérac (16)



Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAd	-	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i> Temminck, 1820	PN3	NT	-	-	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Bruant zizi <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	NAd	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Buse variable <i>Buteo buteo</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAc	NAd	LC	-	3	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Chouette hulotte <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAc	-	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Corneille noire <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	DO2	LC	NAd	-	LC	-	8	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	DD	LC	-	14	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAc	NAd	LC	-	1	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAc	NAd	LC	-	6	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i> Boddaert, 1783	PN3	NT	-	DD	NT	-	4	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius</i> Linnaeus, 1758	DO2	LC	NAd	-	LC	-	7	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE
Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	PN3	LC	-	-	LC	-	3	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	DO2	LC	NAd	NAd	LC	-	4	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	NAc	LC	-	14	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Martinet noir <i>Apus apus</i> Linnaeus, 1758	PN3	NT	-	DD	NT	-	1	FAIBLE	Survivance , Alimentation	FAIBLE
Merle noir <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	DO2	LC	NAd	NAd	LC	-	18	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE



Suivis de l'avifaune landicole – Session 2024

Landes de Touvérac (16)



Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	NAb	LC	-	17	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	NAb	LC	-	19	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Mésange charbonnière <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAb	NAd	LC	-	21	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Milan noir <i>Milvus migrans</i> Boddaert, 1783	PN3 DO1	LC	-	NAd	LC	-	2	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAd	-	LC	-	15	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Pic vert <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	-	LC	-	6	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Pigeon ramier <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	DO2,3	LC	LC	NAd	LC	-	17	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAd	NAd	LC	-	33	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	DD	LC	-	7	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i> Vieillot, 1887	PN3	LC	NAd	NAd	LC	-	34	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	PN3	LC	-	NAd	LC	-	11	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAd	NAd	LC	-	12	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto</i> Frisch, 1838	DO2	LC	-	NAd	LC	-	3	TRES FAIBLE	Reproduction , Alimentation	TRES FAIBLE
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	NAd	-	LC	-	5	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE
Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	PN3	LC	-	NAb	-	-	2	FAIBLE	Reproduction , Alimentation	FAIBLE